

慕拉適®貼藥

經皮止痛消炎劑

日本製造

有效緩解一般腰痛、骨關節痛、肌肉痛等症狀¹

使用方法




1 把有黏性的一側貼近患處。



2 跟隨箭咀方向，用手按著貼藥，將其膠膜
沿著患處滑開並貼上貼藥。



3 將剛才摺起的一邊翻正，
並以相同的方式滑開膠膜使其貼服。



4 完成

參考資料：1. MOHRUS® PATCH package insert (2018 Oct)

請仔細閱讀盒內之說明書，並正確使用本產品。

如果出現皮疹，發紅，發癢或腫脹等異常情況，請立即停止使用，防止患處暴露於陽光，並諮詢醫生或皮膚科醫生。

Hisamitsu

DKSH

使用慕拉適®貼藥人士請注意



1. 使用本產品期間，如敷貼部位照射陽光，可能引發過敏症狀（例如：出疹、發紅、發癢、腫脹等）。



2. 其他注意事項：

- 孕婦在懷孕後期請勿使用本品。




使用本產品期間，請避免敷貼部位接觸陽光*

① 避免前往海灘及進行高爾夫、網球等戶外運動。

② 無論天氣如何，外出時請用衣服、繩帶等遮蓋敷貼部位，避免其受陽光照射。

③ 撕除本藥品後，於四星期內也請遵從上述注意事項。

例：敷貼於腰部時



* 未滿 20 歲人士，由於在學期間，課外活動等接觸陽光的機會很多，出現皮膚炎症狀的可能性較高，請特別注意。

對(如：貼布、凝膠、軟膏、噴劑)外用藥、化妝品、太陽油及香水等有過敏症者，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。



如對本產品及成份有過敏者，使用後可能會引起皮膚炎症狀。

若症狀未改善或惡化，請立即停止使用並向醫生或藥劑師查詢。



- 如出現皮膚炎症狀，請立即停止使用並向醫生或藥劑師查詢，避免做成斑疹惡化，嚴重者或會惡化致全身。
- 出現皮膚炎症狀後，有可能產生色斑(色素沉著)。
- 對本產品出現皮膚炎或過敏者，今後也不應使用 ketoprofen(酮洛芬)製劑(塞劑等不同形式的製劑)。

不可把本產品轉讓給他人(如：親友等)

曾有過因錯誤使用而造成皮膚炎及過敏的例子。

